Exercice 1

1. La fonction f est continue et positive sur $[0, 1]$, le réel I représente l'aire, en unités d'aire, du domaine $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

2. a. Pour tout x , $u'(x) = 1$, $v'(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$, on a alors :

$$2(u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) = 2(e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}xe^{\frac{x}{2}}) = e^{\frac{x}{2}}(x + 2) = f(x).$$

b. Pour tout x , $2(uv)'(x) = 2(u'(x)v(x) + u(x)v'(x))$.

Ainsi $f = 2(uv)'$, donc une primitive de f est $2uv$.

$$\text{On en déduit que } I = \int_0^1 2(uv)'(x)dx = 2[u(x)v(x)]_0^1 = 2e^{\frac{1}{2}}.$$

3. a. $s_3 = \frac{1}{3}(f(0) + f(1/3) + f(2/3))$ représente bien l'aire des trois rectangles hachurés.

b. On applique la méthode des rectangles, donc $\lim s_n = I$.

Exercice 2

1. a. Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f_1(x) = \ln(1+x)$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x) = +\infty$, $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, d'où, par composition des limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty$.

b. Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f_1'(x) = \frac{1}{x+1} > 0$, f_1 est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

c. $I_1 = \int_0^1 \ln(1+x)dx$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $h'(x) = \ln(x+1) + \frac{x+1}{x+1} - 1 = \ln(x+1)$. D'où :

$$I_1 = \int_0^1 \ln(1+x)dx = [(x+1)\ln(1+x) - x]_0^1 = 2\ln 2 - 1.$$

$f_1(0) = 0$ et f_1 est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc $f_1 \geq 0$ sur $\mathbb{R}^+$.

I_1 est l'aire, en unités d'aire, entre la courbe de f_1 , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

2. a. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in [0, 1]$, on a successivement :

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x^n \leq 1 \quad \text{car } x \mapsto x^n \text{ est une fonction croissante sur } \mathbb{R}^+$$

$$1 \leq 1 + x^n \leq 2$$

$$0 \leq \ln(1 + x^n) \leq \ln 2 \quad \text{car } \ln \text{ est croissante}$$

D'où, en intégrant dans le sens croissant de 0 à 1, on obtient : $0 \leq I_n \leq \int_0^1 \ln 2 dx = \ln 2$.

b. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in [0, 1]$, on a successivement :

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x^{n+1} \leq x^n \quad \text{car } x^n \geq 0 \text{ sur } \mathbb{R}^+$$

$$1 \leq 1 + x^{n+1} \leq 1 + x^n$$

$$0 \leq \ln(1 + x^{n+1}) \leq \ln(1 + x^n) \quad \text{car } \ln \text{ est croissante}$$

D'où, en intégrant dans le sens croissant de 0 à 1, on obtient : $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$.

La suite (I_n) est décroissante.

c. La suite (I_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $g(x) = \ln(1+x) - x$.

a. Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $g'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1}$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	0	-
$g(x)$	0

b. Au vu du tableau, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $g(x) \leq 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $x^n \geq 0$, donc $g(x^n) \leq 0$, soit $\ln(1+x^n) \leq x^n$.

c. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in [0,1]$, $\ln(1+x^n) \leq x^n$; d'où, en intégrant dans le sens

croissant de 0 à 1, on obtient : $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. Or $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, donc, par le théorème d'encadrement, $\lim I_n = 0$.

Exercice 3

1. a. $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - 1) dx = [-\cos x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \pi/2$.

b. $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = [\ln(1 + \sin x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2$.

2. D est le domaine du plan limité par les courbes C_f , C_g et les droites d'équations $x = 0$ et

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

Sur l'intervalle I, $f(x) - g(x) \geq 0$, donc

aire(D) = $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x) - g(x)) dx = J - K = \ln 2 + \pi/2 - 1$ en u.a., on multiplie par 16 pour avoir l'aire en cm^2 .