



### Exercice n° 3 (enseignement obligatoire)

On donne le tableau de variations d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbf{R}$ .

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$1$	$+\infty$
$f(x)$	0		0	2	1
		↘	↗	↘	
		-1			1

- On considère les intégrales  $I = \int_0^3 f(t) dt$ ,  $J = \int_{-5}^{-2} f(t) dt$  et  $K = \int_{-1}^1 f(t) dt$ .  
Pour une seule de ces intégrales, on peut affirmer qu'elle est positive et pour une seule, on peut affirmer qu'elle est négative. Préciser ces deux intégrales et justifier ce choix.
- (a) À l'aide des informations contenues dans le tableau de variations de  $f$ , donner un encadrement par des nombres entiers de chacune des intégrales  $A = \int_0^1 f(t) dt$  et  $B = \int_1^2 f(t) dt$ .  
(b) Donner un encadrement de l'intégrale  $C = \int_0^2 f(t) dt$ .
- Étudier la limite de  $\int_0^x f(t) dt$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

### Exercice n° 4 (enseignement obligatoire)

Pour chaque proposition, indiquer si elle est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée.

- Les propositions vraies sont des conséquences immédiates de théorèmes du programme de terminale ; la démonstration consiste à énoncer le théorème.
- Pour les propositions fausses, la démonstration consiste à fournir un contre exemple (un graphique sera accepté).
- Une réponse non démontrée ne rapporte pas de point.

On considère une fonction  $f$  définie et continue sur  $\mathbf{R}$ .

- On a :  $\int_1^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = \int_1^4 f(x) dx$ .
- On a  $\int_1^2 (-f(x)) dx = - \int_1^2 f(x) dx$ .
- Si  $f$  est positive sur  $\mathbf{R}$  alors, pour tout réel  $t$ ,  $\int_0^t f(x) dx$  est un nombre réel positif.
- Si  $\int_0^1 f(x) dx$  est un nombre positif alors la fonction  $f$  est positive sur  $[0, 1]$ .

### Exercice n° 5 (enseignement obligatoire)

On considère une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$  et un nombre réel  $a$  appartenant à  $I$ .

1. Rappeler la définition de «  $f$  est dérivable en  $a$  ».
2. Dans chacun des cas suivants, indiquer s'il existe une fonction  $f$  vérifiant simultanément les deux propriétés. Si la réponse est « oui », donner un exemple (un graphique sera accepté); dans le cas contraire, justifier la réponse à l'aide d'un théorème du cours.
  - $f$  est continue en  $a$  et  $f$  est dérivable en  $a$ ;
  - $f$  est continue en  $a$  et  $f$  n'est pas dérivable en  $a$ ;
  - $f$  n'est pas continue en  $a$  et  $f$  est dérivable en  $a$ ;
  - $f$  n'est pas continue en  $a$  et  $f$  n'est pas dérivable en  $a$ .

### Exercice n° 6 (enseignement obligatoire)

Soit  $(u_n)$  une suite. On considère les propriétés suivantes :

- P<sub>1</sub> la suite  $(u_n)$  est majorée;
- P<sub>2</sub> la suite  $(u_n)$  n'est pas majorée;
- P<sub>3</sub> la suite  $(u_n)$  converge;
- P<sub>4</sub> la suite  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$ ;
- P<sub>5</sub> la suite  $(u_n)$  est croissante.

1. Donner la traduction mathématique de la propriété P<sub>1</sub>.
2. Si les propriétés P<sub>1</sub> et P<sub>5</sub> sont vraies, que peut-on en conclure pour  $(u_n)$  (on ne demande pas de justifier la réponse) ?
3. Si les propriétés P<sub>2</sub> et P<sub>5</sub> sont vraies, que peut-on en conclure pour  $(u_n)$  (on ne demande pas de justifier la réponse) ?
4. Une suite vérifiant la propriété P<sub>4</sub> vérifie-t-elle nécessairement la propriété P<sub>2</sub> (on demande de justifier la réponse) ?

### Exercice n° 7 (enseignement obligatoire)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ . On rappelle que pour tout vecteur  $\vec{w}$  non nul, d'affixe  $z$ , on a :  $|z| = \|\vec{w}\|$  et  $\arg(z) = (\vec{u}, \vec{w})$ , défini à  $2k\pi$  près (avec  $k$  entier relatif).

Dans cet exercice, on prend comme prérequis le résultat suivant :

Si  $z$  et  $z'$  sont deux nombres complexes non nuls alors  $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$  (à  $2k\pi$  près).

1. Soit  $z$  et  $z'$  sont deux nombres complexes non nuls, **démontrer que**  
 $\arg \frac{z}{z'} = \arg(z) - \arg(z')$  (à  $2k\pi$  près).

On note  $A$  et  $B$  les points d'affixes respectives  $2i$  et  $-1$ .

À tout nombre complexe  $z$ , distinct de  $2i$ , on associe le nombre complexe

$$Z = \frac{z+1}{z-2i}.$$

2. Donner une interprétation géométrique de l'argument de  $Z$  dans le cas où  $z \neq -1$ .
3. Déterminer et représenter graphiquement, en utilisant la question précédente, les ensembles de points suivants :
  - (a) L'ensemble  $E$  des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $Z$  soit un nombre réel strictement négatif.
  - (b) L'ensemble  $F$  des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $Z$  soit un nombre imaginaire pur non nul.

### Exercice n° 8 (enseignement obligatoire)

Préciser si chacune des quatre affirmations suivantes est « VRAIE » ou « FAUSSE ». Chaque fois que la réponse est « FAUSSE » une justification doit être donnée.

1. Pour tout nombre réel  $a$  et tout nombre réel  $b$ ,  $e^{a+b} = \sqrt{e^{2a} \times e^{2b}}$ .
2. Pour tout nombre réel  $a$  et tout nombre réel  $b$ ,  $2e^{a+b} = e^{2a} + e^{2b}$ .
3. Il existe un nombre réel  $a$  et un nombre réel  $b$ , tels que  $2e^{a+b} = e^{2a} + e^{2b}$ .
4. Il existe un nombre réel  $a$  et un nombre réel  $b$ , tels que  $e^{2a} + e^{2b} < 2e^{a+b}$ .

### Exercice n° 9 (spécialité)

On considère un triangle  $OA_0B_0$  rectangle isocèle en  $O$  et tel que la distance  $A_0B_0$  soit égale à  $4\sqrt{2}$ . On précise de plus que l'angle  $(\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OB_0})$  est un angle droit direct.

On définit alors pour tout entier naturel  $n$  les points  $A_{n+1}$  et  $B_{n+1}$  de la façon suivante :

- $A_{n+1}$  est le milieu du segment  $[A_nB_n]$ ;
- $B_{n+1}$  est le symétrique du point  $A_{n+1}$  par rapport à la droite  $(OB_n)$ .

1. Représenter le triangle  $OA_0B_0$ , puis construire les points  $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3$ .
2. (a) **Démonstration de cours.** Démontrer qu'il existe une similitude directe et une seule qui transforme  $A_0$  en  $A_1$  et  $B_0$  en  $B_1$ .  
 (b) Soit  $s$  cette similitude : préciser son angle et son rapport, puis vérifier que son centre est  $O$ . Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ , la similitude  $s$  transforme  $A_n$  en  $A_{n+1}$  et  $B_n$  en  $B_{n+1}$ .
3. (a) Démontrer que les points  $O, A_n$  et  $A_p$  sont alignés si et seulement si les entiers  $n$  et  $p$  sont congrus modulo 4.  
 (b) On désigne par  $\Omega$  le point d'intersection des droites  $(A_0B_4)$  et  $(B_0A_4)$ . Démontrer que le triangle  $A_0\Omega B_0$  est isocèle en  $\Omega$ .  
 (c) Calculer la distance  $A_0B_4$ .  
 (d) Démontrer que  $\Omega A_0 = 4\Omega B_4$ .  
 (e) En déduire l'aire du triangle  $A_0\Omega B_0$ .

### Exercice n° 10 (spécialité)

On considère un triangle  $OA_0B_0$  rectangle isocèle en  $O$  et tel que la distance  $A_0B_0$  soit égale à  $4\sqrt{2}$ . On précise de plus que l'angle  $(\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OB_0})$  est un angle droit direct.

On définit alors pour tout entier naturel  $n$  les points  $A_{n+1}$  et  $B_{n+1}$  de la façon suivante :

- $A_{n+1}$  est le milieu du segment  $[A_nB_n]$ ;
  - $B_{n+1}$  est le symétrique du point  $A_{n+1}$  par rapport à la droite  $(OB_n)$ .
1. Représenter le triangle  $OA_0B_0$ , puis construire les points  $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3$ .
  2. Soit  $s$  la similitude directe de centre  $O$  qui transforme  $A_0$  en  $A_1$ .
    - (a) Déterminer l'angle et le rapport de la similitude  $s$ , puis montrer que la similitude  $s$  transforme  $B_0$  en  $B_1$ .
    - (b) Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ , la similitude  $s$  transforme  $A_n$  en  $A_{n+1}$  et  $B_n$  en  $B_{n+1}$ .
  3. (a) Démontrer que les points  $O, A_n$  et  $A_p$  sont alignés si et seulement si les entiers  $n$  et  $p$  sont congrus modulo 4.
    - (b) On désigne par  $\Omega$  le point d'intersection des droites  $(A_0B_4)$  et  $(B_0A_4)$ . Déterminer la valeur exacte de l'aire du triangle  $A_0\Omega B_0$  (tout élément de réponse, par exemple l'exposé d'une méthode ou la détermination d'une valeur approchée, sera pris en compte).

### Exercice n° 11 (enseignement obligatoire)

**Prérequis** : la fonction exponentielle, notée  $\exp$ , a les trois propriétés suivantes :

1.  $\exp$  est une fonction dérivable sur  $\mathbf{R}$ ;
2. sa fonction dérivée, notée  $\exp'$ , est telle que, pour tout nombre réel  $x$ ,  $\exp'(x) = \exp(x)$ ;
3.  $\exp(0) = 1$ .

En n'utilisant que ces trois propriétés de la fonction  $\exp$ , **démontrer** successivement que :

- Pour tout nombre réel  $x$ ,  $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$ ;
- pour tout nombre réel  $a$  et tout nombre réel  $x$ ,  $\exp(a+x) = \exp(a) \times \exp(x)$ .

### Exercice n° 12 (enseignement obligatoire)

Soit  $b$  un nombre réel strictement positif.

1. Exprimer en fonction de  $b$  un nombre  $A_1$  tel que pour tout nombre réel  $x$  strictement positif supérieur à  $A_1$  on ait  $\frac{1}{x} < b$ .
2. Exprimer en fonction de  $b$  un nombre  $A_2$  tel que pour tout nombre réel  $x$  positif supérieur à  $A_2$  on ait  $\frac{1}{2x+1} < b$ .
3. Soit  $f$  une fonction définie sur l'intervalle  $]0, +\infty[$  telle que pour tout  $x$  de cet intervalle on ait  $\frac{-1}{2x+1} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$ .
  - (a) Proposer un nombre réel  $A$ , à exprimer en fonction de  $b$ , tel que pour tout nombre réel  $x$  positif supérieur ou égal à  $A$  on ait  $f(x) \in ]-b, b[$ .
  - (b) Quelle propriété de la fonction  $f$  est démontrée à la question (a) ?
  - (c) Proposer une autre justification de cette propriété de la fonction  $f$  à l'aide d'un théorème figurant au programme de terminale S. On énoncera ce théorème avec précision.

## Exercice n° 13 (enseignement obligatoire)

### Partie A Démonstration de cours.

Soit  $(u_n)$  une suite croissante non majorée.

1. Soit  $M$  un nombre réel et  $n_0$  un entier naturel tel que  $u_{n_0} \geq M$ .  
Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ , si  $n \geq n_0$  alors  $u_n \geq M$ .
2. Quelle conséquence peut-on en tirer pour la suite  $(u_n)$  ?
3. Énoncer le théorème du cours ainsi démontré.

### Partie B

Répondre par Vrai ou Faux aux propositions suivantes :

- a. Si une suite n'est pas majorée alors elle tend vers  $+\infty$ .
- b. Si une suite est croissante alors elle tend vers  $+\infty$ .
- c. Si une suite tend vers  $+\infty$  alors elle n'est pas majorée.
- d. Si une suite tend vers  $+\infty$  alors elle est croissante.

## Exercice n° 14 (enseignement obligatoire)

### Partie I

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Pour chaque question, une réponse exacte rapporte le nombre de points affectés ; une réponse inexacte enlève la moitié du nombre de points affectés.

Le candidat peut décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Ces questions ne rapportent aucun point et n'en enlèvent aucun.

Si le total est négatif, la note est ramenée à 0.

Pour chacune des affirmations suivantes répondre sans justification par Vrai ou Faux :

- (A) Toute suite bornée est convergente.
- (B) Pour toutes suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  à valeurs strictement positives qui tendent vers  $+\infty$ , la suite de terme général  $\frac{u_n}{v_n}$  converge vers 1.
- (C) Toute suite croissante non majorée tend vers  $+\infty$ .

### Partie II

Pour chacune des propositions de la première partie, justifier la réponse donnée :

- dans le cas où la proposition vous paraît fausse : en donnant un contre-exemple.
- dans le cas où la proposition vous paraît exacte : en donnant une démonstration.

## Exercice n° 15 (enseignement obligatoire)

Le but de l'exercice est d'établir dans un cas particulier le lien existant entre aire sous la courbe et primitive. On prendra comme prérequis la définition suivante :


**Définition :**  $H$  est une primitive de  $h$  sur un intervalle  $I$  si et seulement si  $H$  est dérivable sur  $I$  et si pour tout  $x$  de  $I$  on a  $H'(x) = h(x)$ .

Dans la suite on note  $f$  la fonction définie sur  $\mathbf{R}$  par  $f(t) = \ln(t^2 + 1)$ .

1. Expliquer pourquoi  $f$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .

2. Montrer que  $f$  est croissante sur  $[0, +\infty[$ .

La fonction  $f$  est représentée ci-dessous :



Pour  $\alpha \geq 0$ , on note  $A(\alpha)$  l'aire de la portion de plan limitée par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la courbe représentative de  $f$  et la droite d'équation  $x = \alpha$ .

3. Soit  $x_0$  un réel strictement positif.

(a) Soit  $h$  un réel strictement positif. En utilisant des rectangles convenablement choisis, établir l'encadrement :

$$\ln(1 + x_0^2) \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{h} \leq \ln(1 + (x_0 + h)^2).$$

(b) Quel encadrement peut-on obtenir de la même manière pour  $-x_0 \leq h < 0$ ?

(c) **Démontrer** que la fonction  $A$  est dérivable en  $x_0$ . Quel est le nombre dérivé de  $A$  en  $x_0$ ?

4. Quel lien a-t-on établi entre les fonctions  $A$  et  $f$  sur  $]0, +\infty[$ ?

## Exercice n° 16 (spécialité)

### 1. Démonstration de cours.

Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

2. Soit  $p$  un nombre premier strictement plus grand que 2. Démontrer que  $p$  est congru à 1 ou à  $-1$  modulo 4. Donner deux exemples de chacun de ces cas.

*Le but de ce qui suit est de répondre à la question suivante : « Les nombres premiers  $p$  congrus à  $-1$  modulo 4 sont-ils en nombre fini ? »*

Supposons que ce soit le cas : soit  $n$  le nombre des nombres premiers congrus à  $-1$  modulo 4, notons  $A = p_1 p_2 \cdots p_n$  le produit de ces nombres et  $B = 4A - 1$ .

3. Montrer que  $B$  est congru à  $-1$  modulo 4.
4. Soit  $q$  un diviseur premier de  $B$ . Montrer que  $q$  est distinct de chacun des nombres  $p_1, p_2, \dots, p_n$  précédents.  
Montrer que parmi les diviseurs premiers de  $B$ , l'un au moins est congru à  $-1$  modulo 4.
5. Quelle réponse apporter à la question posée ?

## Exercice n° 17 (enseignement obligatoire)

On cherche les nombres réels  $a$  strictement positifs et les fonctions  $f$  définies et continues sur l'intervalle  $[a, +\infty[$ , vérifiant, pour tout  $x$  supérieur ou égal à  $a$ , la relation  $\int_a^x f(t) dt = 2 \ln x$ .

Démontrer que le problème posé a une et une seule solution, que l'on déterminera.

## Exercice n° 18 (enseignement obligatoire)

Soit  $a$  un réel strictement positif.

1. Le plan étant rapporté à un repère orthonormal, rappeler la nature de l'ensemble des points dont les coordonnées  $(x, y)$  vérifient l'équation  $x^2 + y^2 = a^2$ .
2. On pose  $I(a) = \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ . En interprétant  $I(a)$  comme une aire déterminer  $a$  pour que l'on ait  $I(a) = \pi$ .

## Exercice n° 19 (enseignement obligatoire)

On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Soit  $t$  la translation de vecteur  $\vec{w} = 2\vec{u}$  qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$ . Donner l'écriture complexe de la transformation  $t$ , c'est-à-dire l'expression de  $z'$  en fonction de  $z$ .
2. Soit  $r$  la transformation du plan qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le point  $M_1$  d'affixe  $z_1$  telle que  $z_1 = -iz + 4i$ .
  - (a) Déterminer un point  $\Omega$  tel que  $r(\Omega) = \Omega$ .
  - (b) Démontrer que  $r$  est une rotation de centre  $\Omega$  dont on précisera l'angle.
3. Déterminer la nature de la transformation  $r \circ t$ .

## Exercice n° 20 (enseignement obligatoire)

### Partie I

$\varphi$  est la fonction définie sur  $]0, 1]$  par  $x \mapsto \varphi(x) = -\frac{\ln(x)}{\ln(2)}$ .

Pour un événement  $A$  de probabilité  $P(A)$  non nulle, on pose  $i(A) = \varphi(P(A))$ . En théorie de l'information, ce nombre  $i(A)$  est appelé *incertitude de l'événement*  $A$ .

1. On choisit une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit  $A$  l'événement « la carte tirée est la dame de cœur ». Que valent  $P(A)$  et  $i(A)$  ?
2. Soit  $n$  un entier naturel non nul. On lance  $n$  fois une pièce équilibrée.  $A$  est l'événement « obtenir  $n$  fois PILE ». Déterminer  $i(A)$ .
3. Que vaut  $i(A)$  lorsque  $P(A) = 1$  ? Commenter le résultat.
4. Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants pour la probabilité  $P$  et si  $P(A \cap B) \neq 0$ , démontrer que  $i(A \cap B) = i(A) + i(B)$ .
5. Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x)$ . Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat en termes d'incertitude ?

### Partie II

$h$  est la fonction définie sur  $[0, 1]$  par :

$$h(0) = 0 \text{ et, pour tout } x \text{ de } ]0, 1], h(x) = -x \frac{\ln(x)}{\ln(2)}.$$

On admet que  $h$  est continue sur  $[0, 1]$ .

On définit également la fonction  $h_1$  sur  $[0, 1]$  par  $h_1(x) = h(x) + h(1-x)$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $h_1$ .
2. Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre  $p \in ]0, 1[$ . On appelle incertitude moyenne de  $X$  la quantité  $h_1(p)$ .
  - (a) Donner la valeur de  $p$  pour laquelle  $h_1(p)$  est maximum.
  - (b) Commenter ce résultat.

## Exercice n° 21 (enseignement obligatoire)

Dans une pièce à température constante de  $20^\circ\text{C}$ , à l'instant initial, noté 0, la température  $\theta(0)$  d'un liquide est égale à  $70^\circ\text{C}$ .

Cinq minutes plus tard, elle est de  $60^\circ\text{C}$ .

On admet que la température  $\theta$  du liquide est une fonction dérivable du temps  $t$ , exprimé en minutes, et que  $\theta'(t)$  est proportionnel à la différence entre la température  $\theta(t)$  et celle de la pièce. On notera  $a$  le coefficient de proportionnalité,  $a \in \mathbf{R}$ .

### 1. Démonstration de cours.

Soit (E) l'équation différentielle  $z' = az$ .

**Prérequis** : la fonction  $x \mapsto e^{ax}$  est solution de l'équation (E).

**Démontrer** que toute solution de (E) est de la forme  $x \mapsto Ce^{ax}$ , où  $C$  est une constante réelle.

2. Résoudre l'équation différentielle :  $y' = ay - 20a$ .
3. Quelle sera la température du liquide 30 minutes après l'instant initial ?

### Exercice n° 22 (enseignement obligatoire)

Soit  $(u_n)$  une suite telle que les suites de terme général  $v_n = 1 + u_n$  et  $w_n = 3 - u_n$  soient adjacentes. Étudier la convergence de la suite  $(u_n)$ , et préciser, le cas échéant, sa limite.

### Exercice n° 23 (enseignement obligatoire)

Soit  $E_1$  l'ensemble des fonctions solutions de l'équation différentielle  $y' = y$ .

Soit  $E_2$  l'ensemble des fonctions solutions de l'équation différentielle  $y'' = y$ .

Le but de l'exercice est de démontrer qu'il existe une unique fonction  $f$  qui appartient à  $E_2$ , et qui vérifie  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 0$ .

1. Vérifier que les fonctions définies sur  $\mathbf{R}$  par  $x \mapsto e^x$  et  $x \mapsto e^{-x}$  sont des éléments de  $E_2$ .
2. Soit  $f$  une fonction deux fois dérivable sur  $\mathbf{R}$ , on pose  $u = f + f'$ .
  - (a) Démontrer que  $f$  appartient à  $E_2$  si et seulement si  $u$  appartient à  $E_1$ .
  - (b) **Démonstration de cours.**  
**Prérequis :**
    - La fonction  $x \mapsto e^x$  est élément de  $E_1$  ;
    - pour tout  $x$  réel,  $e^x \times e^{-x} = 1$ .**Démontrer** l'unicité de la fonction  $u$  élément de  $E_1$  qui vérifie  $u(0) = 1$ .
3. Soit  $f$  un élément de  $E_2$ . On pose, pour tout réel  $x$ ,  $g(x) = f(x)e^x$ .
  - (a) Démontrer que si  $f$  vérifie  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 0$ , alors  $g'(x) = e^{2x}$ .
  - (b) Démontrer qu'il existe une seule fonction  $f$  répondant au problème posé et déterminer son expression.

### Exercice n° 24 (enseignement obligatoire)

1. Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .
  - (a) Soient  $u, v, w, x_0, y_0$  des nombres réels tels que  $u^2 + v^2 \neq 0$ .  
**Établir** une formule donnant la distance du point  $M_0$  de coordonnées  $(x_0, y_0)$  à la droite d'équation  $ux + vy + w = 0$ .
  - (b) Soient  $a$  et  $b$  des réels strictement positifs, on considère les points  $A(a, 0)$  et  $B(0, b)$ .  
Calculer la distance du point  $O$  à la droite  $AB$ .
2. Soient  $a, b, c$  des réels strictement positifs.  
 Dans l'espace rapporté au repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère les points  $A(a, 0, 0)$ ,  $B(0, b, 0)$  et  $C(0, 0, c)$ .
  - (a) Calculer la distance du point  $C$  à la droite  $AB$ .
  - (b) Montrer la relation

$$\text{Aire}(ABC)^2 = \text{Aire}(OAB)^2 + \text{Aire}(OBC)^2 + \text{Aire}(OCA)^2.$$

### Exercice n° 25 (spécialité)

Soit  $j = e^{2i\pi/3}$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $2\pi/3$ . On désigne par  $A$  l'ensemble des nombres complexes de la forme  $a + bj$ , où  $a$  et  $b$  sont des entiers relatifs.

1. Montrer que, pour tout élément  $z$  de  $A$ ,  $|z|^2$  est un entier.
2. Quels sont les éléments  $z$  non nuls de  $A$  qui sont tels que  $\frac{1}{z}$  soit également élément de  $A$  ?

### Exercice n° 26 (spécialité)

Pour tout entier  $n \geq 1$  on pose  $u_n = 1! + 2! + \dots + n!$

On donne la décomposition en facteurs premiers des dix premiers termes de la suite  $(u_n)$  :

$u_1 = 1$
$u_2 = 3$
$u_3 = 3^2$
$u_4 = 3 \times 11$
$u_5 = 3^2 \times 17$
$u_6 = 3^2 \times 97$
$u_7 = 3^4 \times 73$
$u_8 = 3^2 \times 11 \times 467$
$u_9 = 3^2 \times 131 \times 347$
$u_{10} = 3^2 \times 11 \times 40787$

1. Montrer que  $u_n$  n'est jamais divisible par 2, par 5 ni par 7.
2. Peut-on affirmer que  $u_n$  est divisible par 11 à partir d'un certain rang ?
3. Peut-on affirmer que, à partir d'un certain rang,  $u_n$  est divisible par  $3^2$  mais pas par  $3^3$  ?

### Exercice n° 27 (enseignement obligatoire)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ . On rappelle que pour tout vecteur  $\vec{w}$  non nul, d'affixe  $z$ , on a :  $|z| = \|\vec{w}\|$  et  $\arg(z) = (\vec{u}, \vec{w})$ , défini à  $2k\pi$  près (avec  $k$  entier relatif).

Dans cet exercice, on prend comme prérequis le résultat suivant :

Si  $z$  et  $z'$  sont deux nombres complexes non nuls alors  $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$  (à  $2k\pi$  près).

1. Soient  $M$ ,  $N$  et  $P$  trois points du plan, d'affixes  $m$ ,  $n$  et  $p$  tels que  $m \neq n$  et  $m \neq p$ .

(a) **Démontrer** que  $\arg\left(\frac{p-m}{n-m}\right) = (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP})$  (à  $2k\pi$  près).

(b) Interpréter géométriquement  $\left|\frac{p-m}{n-m}\right|$ .

2. En déduire la traduction complexe d'une rotation de centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega$  et d'angle de mesure  $\theta$ ,  $\theta$  désignant un nombre réel.

### Exercice n° 28 (enseignement obligatoire)

À tout nombre complexe  $z = x + iy$  où  $x$  et  $y$  désignent la partie réelle et la partie imaginaire de  $z$ , on associe le nombre complexe  $f(z) = e^y(\cos(\pi x) + i \sin(\pi x))$ .

- Déterminer et placer, dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ , les points d'affixes  $f(0)$ ,  $f(i)$ ,  $f(-i)$ ,  $f(1+i)$  et  $f(1-i)$ .
- Pour tout nombre complexe  $z = x + iy$ , démontrer que  $f(z)$  est non nul, puis déterminer en fonction de  $x$  et  $y$  le module et un argument de  $f(z)$ .
- Démontrer que pour tous les nombres complexes  $z$  et  $z'$ ,  $f(z+z') = f(z)f(z')$  et  $f(z-z') = \frac{f(z)}{f(z')}$ .
  - Démontrer que pour tout entier relatif  $n$ , pour tout nombre complexe  $z$ ,  $f(nz) = (f(z))^n$ .
- Soit  $A$  le point du plan d'affixe  $w = 1+i$ . Soient  $B$ ,  $C$ , et  $D$  les points d'affixes respectives  $\bar{w}$ ,  $-w$  et  $-\bar{w}$ 
  - Déterminer l'ensemble  $L$  des points du plan dont l'affixe  $z = x+iy$  vérifie  $\begin{cases} |x| \leq 1 \\ |y| = 1 \end{cases}$  puis déterminer l'ensemble des points du plan d'affixe  $f(z)$ , où  $z$  est l'affixe d'un élément de  $L$ .
  - Déterminer l'ensemble  $K$  des points du plan dont l'affixe  $z = x+iy$  vérifie  $\begin{cases} |x| \leq 1 \\ |y| \leq 1 \end{cases}$  puis déterminer l'ensemble des points du plan d'affixe  $f(z)$ , où  $z$  est l'affixe d'un élément de  $K$ .

### Exercice n° 29 (spécialité)

**Définition de la congruence modulo 11 :** On rappelle que si  $a$  et  $b$  désignent deux entiers relatifs, on dit que  $a$  est congru à  $b$  modulo 11, et on écrit  $a \equiv b[11]$ , si et seulement si il existe un entier relatif  $k$  tel que  $a = b + 11k$ .

- Démonstration de cours.**  
**Prérequis :** Définition de la congruence modulo 11.  
 Démontrer que si  $a \equiv b[11]$  et  $c \equiv d[11]$  alors  $a + c \equiv b + d[11]$  et  $ac \equiv bd[11]$ .  
 (b) En déduire que si  $a \equiv b[11]$ , alors pour tout  $n$  entier naturel on a :  $a^n \equiv b^n[11]$ .
- Soit  $n$  un entier naturel dont l'écriture en base 10 est  $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ , ce qui signifie que  $n = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^{n-1}a_{n-1} + 10^n a_n$ .  
 Établir que  $n$  est divisible par 11 si, et seulement si, le nombre  $a_0 - a_1 + a_2 + \dots + (-1)^n a_n$  est multiple de 11.

### Exercice n° 30 (enseignement obligatoire)

Soit  $\mathcal{C}$  un cercle de rayon 4 cm.

Quelle est l'aire maximale d'un rectangle dont les sommets sont sur le cercle  $\mathcal{C}$  ?

## Exercice n° 31 (enseignement obligatoire)

### 1. Démonstration de cours.

**Prérequis** : Définition d'une suite tendant vers  $+\infty$ .

« Une suite  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  si, pour tout réel  $A$ , tous les termes de la suite sont, à partir d'un certain rang, supérieurs à  $A$  ».

**Démontrer** le théorème suivant :

*Une suite croissante non majorée tend vers  $+\infty$*

2. On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et la relation  $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$ .

- (a) Établir que la suite  $(u_n)$  est croissante.
- (b) Démontrer que si la suite  $(u_n)$  a pour limite un réel  $\ell$ , alors  $\ell$  vérifie la relation  $\ell = \ell + e^{-\ell}$ .
- (c) Conclure quant à la convergence de la suite  $(u_n)$ .

## Exercice n° 32 (enseignement obligatoire)

Le but de l'exercice est de démontrer le résultat de cours suivant :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

On rappelle la définition et le théorème suivants :

### Définition :

Soit  $f$  une fonction définie sur l'intervalle  $[A, +\infty[$ , où  $A$  est un réel positif, et soit  $L$  un nombre réel.

Dire que la fonction  $f$  a pour limite  $L$  en  $+\infty$ , signifie que tout intervalle ouvert contenant  $L$  contient tous les nombres  $f(x)$  pour  $x$  assez grand.

**Théorème** : Soit  $L$  un nombre réel,  $f$ ,  $g$  et  $h$  des fonctions définies sur l'intervalle  $[A, +\infty[$ , où  $A$  est un réel positif. Si  $f$ ,  $g$ , et  $h$  vérifient les conditions suivantes :

- Pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[A, +\infty[$ ,  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  ;
- Les fonctions  $g$  et  $h$  ont pour limite  $L$  en  $+\infty$

alors la fonction  $f$  a pour limite  $L$  en  $+\infty$ .

### 1. Démonstration de cours.

En utilisant la définition précédente, démontrer le théorème énoncé ci dessus.

### 2. Application :

- (a) Étudier les variations de la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[1, +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$ .
- (b) Montrer que pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[1, +\infty[$  on a les inégalités  $0 \leq \ln x \leq \sqrt{x}$ .  
En déduire que pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[1, +\infty[$  on a

$$0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

- (c) En déduire la limite de  $\frac{\ln x}{x}$  en  $+\infty$ .



## Exercices « étoilés »

**Exercice n° 33\* (enseignement obligatoire)**

Soient  $n$  et  $k$  deux entiers supérieurs ou égaux à 2.

Montrer que  $n^k$  peut s'écrire comme somme de  $n$  entiers impairs consécutifs.

**Exercice n° 34\* (enseignement obligatoire)**

Si  $a$  et  $b$  sont deux entiers strictement positifs, on désigne par  $m(a, b)$  le plus petit des deux nombres  $\sqrt[a]{b}$  et  $\sqrt[b]{a}$  et on considère l'ensemble  $A = \{m(a, b) \mid (a, b) \in \mathbf{N}^* \times \mathbf{N}^*\}$ .

Montrer que  $A$  est une partie de  $\mathbf{R}$  admettant un plus grand élément que l'on déterminera.

**Exercice n° 35\* (enseignement obligatoire)**

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $r = (O ; \vec{i}, \vec{j})$ .

On considère les droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  d'équations respectives, dans le repère  $r$ ,  $y = \frac{5}{4}(x + 1)$  et  $y = \frac{5}{4e}(x + 5)$ .

Déterminer des nombres réels  $x_1$  et  $x_2$ , avec  $x_1 \neq x_2$ , et une fonction exponentielle  $f$ , c'est-à-dire une fonction de la forme  $x \mapsto Ce^{kx}$ , où  $C$  et  $k$  sont des constantes réelles, telle que la courbe représentative  $\mathcal{C}_f$  de  $f$  soit tangente à  $\Delta_1$  au point d'abscisse  $x_1$  et à  $\Delta_2$  au point d'abscisse  $x_2$ .

**Exercice n° 36\* (enseignement obligatoire)**

Établir que pour tout couple  $(x, y)$  de nombres réels on a l'inégalité

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

**Exercice n° 37\* (enseignement obligatoire)**

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbf{R}$ . On suppose que  $f(0) = 1$ .

1. On suppose vérifiée, pour tout nombre réel  $x$ , la relation  $f(x) + f'(x) \leq 0$ .  
Comparer, pour  $x \geq 0$ ,  $f(x)$  et  $e^{-x}$ .
2. Soit  $a$  un réel positif. On suppose à présent que  $f$  vérifie la relation

$$af(x) + f'(x) \leq 0.$$

Que peut-on en déduire pour  $f$  ?

3. Dans un processus, une certaine quantité est mesurée par une fonction  $g$  du temps  $t$ , qui vérifie l'équation différentielle :

$$g'(t) + 0,001g(t) + k(t)g^2(t) = 0$$

où  $k$  est une fonction positive de  $t$ . Déterminer un instant  $t_0$  tel que l'on puisse affirmer que, pour  $t \geq t_0$  la valeur de  $g(t)$  est inférieure ou égale à 5% de sa valeur initiale  $g(0)$ .

## Exercice n° 38\* (spécialité)

On considère les dix caractères A, B, C, D, E, F, G, H, I et J auxquels on associe dans l'ordre les nombres entiers de 1 à 10. On note  $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ . On appelle *message* tout mot, ayant un sens ou non, formé avec ces dix caractères.

1. On désigne par  $f$  la fonction définie sur  $\Omega$  par «  $f(n)$  est le reste de la division euclidienne de  $5^n$  par 11 ».

On désire coder à l'aide de  $f$  le message « BACF ».

Compléter la grille de chiffrement ci-dessous :

Lettre	B	A	C	F
$n$	2	1	3	6
$f(n)$	3			
Lettre	C			

Peut-on déchiffrer le message codé avec certitude ?

2. On désigne par  $g$  la fonction définie sur  $\Omega$  par «  $g(n)$  est le reste de la division euclidienne de  $2^n$  par 11 ». Établir, sur le modèle précédent, la grille de chiffrement de  $g$ . Permet-elle le déchiffrement avec certitude de tout message codé à l'aide de  $g$  ?
3. Le but de cette question est de déterminer des conditions sur l'entier  $a$  compris entre 1 et 10 pour que la fonction  $h$  définie sur  $\Omega$  par «  $h(n)$  est le reste de la division euclidienne de  $a^n$  par 11 » permette de chiffrer et déchiffrer avec certitude un message de 10 caractères. Soit  $i$  un élément de  $\Omega$ .
- Montrer, en raisonnant par l'absurde, que si, pour tout  $i \in \Omega$ ,  $i < 10$ ,  $a^i$  n'est pas congru à 1 modulo 11, alors la fonction  $h$  permet le déchiffrement avec certitude de tous messages.
  - Montrer que s'il existe  $i \in \Omega$ ,  $i < 10$ , tel que  $a^i \equiv 1[11]$ , alors la fonction  $h$  ne permet pas de déchiffrer un message avec certitude.
  - On suppose que  $i$  est le plus petit entier naturel tel que  $1 \leq i \leq 10$  vérifiant  $a^i \equiv 1[11]$ . En utilisant la division euclidienne de 10 par  $i$ , prouver que  $i$  est un diviseur de 10.
  - Quelle condition doit vérifier le nombre  $a$  pour permettre le chiffrement et déchiffrement avec certitude de tous messages à l'aide de la fonction  $h$  ? Faire la liste de ces nombres.
-