

# Équations de droite : Résumé de cours et méthodes

Le plan est muni d'un repère.

## 1 Rappels sur les équations de droite

**Pour les droites non parallèles à l'axe des ordonnées :**

• Elles admettent une équation de la forme  $y = mx + p$ .

$m$  est le **coefficient directeur** et  $p$  est l'ordonnée à l'origine.

• Dire qu'un point  $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$  appartient à la droite d'équation  $y = mx + p$  signifie que ses coordonnées vérifient l'équation, c'est à dire que  $y_A = mx_A + p$ .

• Etant donné les droites  $D$  d'équation  $y = mx + p$  et  $D'$  d'équation  $y = m'x + p'$  :

$D$  est parallèle à  $D'$  si et seulement si  $m = m'$ .

**Pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées :**

Elles admettent une équation de la forme  $x = c$ .

## 2 Comment déterminer une équation d'une droite connaissant deux de ses points ?

**Méthode générale :** équation de la droite  $D$  passant par  $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$  et  $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ .

• si  $A$  et  $B$  ont la même abscisse alors  $D$  est parallèle à l'axe des ordonnées et admet  $x = x_A$  comme équation.

• Dans le cas contraire, on calcule d'abord le coefficient directeur  $m$  avec la formule suivante :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\text{différence des ordonnées}}{\text{différence des abscisses}}$$


Pour déterminer  $p$ , on exprime que les coordonnées de  $A$  doivent vérifier l'équation, c'est à dire que  $y_A = mx_A + p$ .

**Exemple :** Déterminons une équation de la droite  $D$  passant par  $A \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $B \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

On a  $m = \frac{-1 - (-2)}{4 - 2} = \frac{1}{2}$ . De plus,  $y_A = mx_A + p \Leftrightarrow -2 = \frac{1}{2} \times 2 + p \Leftrightarrow p = -3$ . Une équation de  $D$  est  $y = \frac{1}{2}x - 3$ .

## 3 Comment déterminer une équation de la droite parallèle à une droite connue et passant par un point connu ?

**Méthode générale :** équation de la droite  $D'$  parallèle à la droite  $D$  et passant par  $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ .



• Si  $D$  n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées :

$D$  admet une équation de la forme  $y = mx + p$  et  $D'$  une équation de la forme  $y = m'x + p'$  avec  $m' = m$ . Pour déterminer  $p'$ , on exprime que les coordonnées de  $A$  doivent vérifier l'équation de  $D'$ , c'est à dire que  $y_A = m'x_A + p'$ .

• Si  $D$  est parallèle à l'axe des ordonnées :

$D'$  est aussi parallèle à l'axe des ordonnées et comme elle passe par  $A$ , son équation est  $x = x_A$ .

**Exemple 1 :** Déterminons une équation de la droite  $D'$  parallèle à la droite  $D$  d'équation  $y = 3x - 4$  et passant par  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

On a  $m' = m = 3$  et  $y_A = m'x_A + p' \Leftrightarrow 2 = 3 \times 1 + p' \Leftrightarrow p' = -1$ .

Une équation de  $D'$  est donc  $y = 3x - 1$ .

**Exemple 2 :** On considère les points  $B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $C \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$ .

Déterminons une équation de la droite  $D'$  parallèle à la droite  $(BC)$  et passant par  $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

Le coefficient directeur de  $D'$  est le même que celui de  $(BC)$ . Donc,  $m' = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{8 - 2}{3 - 0} = 2$ .

Et,  $y_A = m'x_A + p' \Leftrightarrow -1 = 2 \times 1 + p' \Leftrightarrow p' = -3$ .

Une équation de  $D'$  est donc  $y = 2x - 3$ .

## 4 Exemple de recherche d'une équation d'une médiane

Dans un repère, on considère les points  $A \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $B \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $C \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ .

• Déterminons une équation de la médiane issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$ .

Elle passe par  $A$  et par  $I$ , le milieu de  $[BC]$ .

Or,  $x_I = \frac{x_B + x_C}{2} = 0$  et  $y_I = \frac{y_B + y_C}{2} = -1$ . Donc,  $I \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

Le coefficient directeur de la médiane est  $m = \frac{y_I - y_A}{x_I - x_A} = \frac{-1 - 1}{0 - (-3)} = -\frac{2}{3}$ .

Et,  $y_A = mx_A + p \Leftrightarrow 1 = -\frac{2}{3} \times (-3) + p \Leftrightarrow p = -1$ .

Une équation de la médiane est donc  $y = -\frac{2}{3}x - 1$ .