EXERCICE 1

[Liban 2016]

1. a. a1. Montrons que $IE = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

Dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AK})$, les coordonnées des points A et C sont respectivement: A (0; 0; 0) et C (1; 1; 0) (car $\overrightarrow{AC} = 1 \times \overrightarrow{AB} + 1 \times \overrightarrow{BC}$).

Or I est le centre du carré ABCD.

Par conséquent: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}$

$$\text{et donc: } \overrightarrow{AI} = \left(\frac{0+1}{2}; \frac{0+1}{2}; \frac{0+0}{2} \right)$$

$$\text{cad: } \overrightarrow{AI} = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0 \right).$$

Sur le graphique, nous remarquons que AEI est rectangle en I.

Ainsi, d'après Pythagore: $AE^2 = IE^2 + AI^2$

$$\text{ou encore: } IE^2 = AE^2 - AI^2.$$

Or: • $AE^2 = 1$ (" Toutes les arêtes sont de longueur 1 ").

$$\bullet AI^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 0^2$$

$$\Rightarrow AI^2 = \frac{1}{2}.$$

D'où: $IE^2 = 1 - \frac{1}{2} \Rightarrow IE^2 = \frac{1}{2}$.

En définitive: $IE^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow IE = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. a. a2. Déduisons-en les coordonnées des points I, E et F:

- Les coordonnées du point I sont: $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$.

- Les coordonnées du point E sont: $E\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\left(\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AD} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \overrightarrow{AK}\right).$$

- Les coordonnées du point F sont: $F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\left(\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AD} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \overrightarrow{AK}\right).$$

Au total: $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$, $E\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ et $F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

1. b. Montrons que le vecteur $\vec{n}(0; -2; \sqrt{2})$ est normal au plan (ABE):

D'après le cours: un vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ est normal à un plan ssi ce vecteur est orthogonal à 2 vecteurs non colinéaires de ce plan.

Ici: • il s'agit du plan (ABE);

- 2 vecteurs non colinéaires de ce plan sont respectivement:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix};$$

- $\vec{n} (0; -2; \sqrt{2})$.

De plus: • $\vec{n}$ et $\vec{AB}$ sont orthogonaux car $(1 \times 0) + (0 \times -2) + (0 \times \sqrt{2}) = 0$;

- $\vec{n}$ et $\vec{AE}$ sont orthogonaux car $\left(\frac{1}{2} \times 0\right) + \left(\frac{1}{2} \times -2\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{2}\right) = 0$.

Par conséquent: $\vec{n}$ est bien orthogonal à 2 vecteurs non colinéaires de ce plan. Donc $\vec{n} (0; -2; \sqrt{2})$ est un vecteur normal au plan (ABE).

1. c. Déterminons une équation cartésienne du plan (ABE):

Ici: • $\vec{n} (a = 0; b = -2; c = \sqrt{2})$ est un vecteur normal au plan (ABE);

- A (0; 0; 0) est un point de l'espace.

D'où, une représentation cartésienne du plan passant par A et de vecteur normal

$\vec{n}$ est: $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$\Leftrightarrow -2(y - 0) + \sqrt{2}(z - 0) = 0$$

$$\Rightarrow -2y + \sqrt{2}z = 0.$$

En conclusion, une équation cartésienne du plan (ABE) est: $-2y + \sqrt{2}z = 0$.

2. a. Démontrons que les plans (FDC) et (ABE) sont parallèles:

D'après le cours:

- Soit $\vec{n}$ le vecteur normal du plan P;
- Soit $\vec{n}'$ le vecteur normal du plan P';
- P et P' sont deux plans parallèles ssi les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires (ou égaux).

Mais d'après le cours, nous savons aussi que: un vecteur $\vec{n}$ (a; b; c) est normal à un plan ssi ce vecteur est orthogonal à 2 vecteurs non colinéaires de ce plan.

Ici: • il s'agit du plan (FDC);

• 2 vecteurs non colinéaires de ce plan sont respectivement: $\vec{FD}$ et $\vec{FC}$.

Or: $F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $D(0; 1; 0)$ et $C(1; 1; 0)$.

D'où: $\vec{FD} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ et $\vec{FC} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$;

• $\vec{n}(0; -2; \sqrt{2})$.

De plus: • $\vec{n}$ et $\vec{FD}$ sont orthogonaux car:

$$\left(0 \times -\frac{1}{2}\right) + \left(-2 \times \frac{1}{2}\right) + \left(\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0;$$

• $\vec{n}$ et $\vec{FC}$ sont orthogonaux car:

$$\left(0 \times \frac{1}{2}\right) + \left(-2 \times \frac{1}{2}\right) + \left(\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

Par conséquent: $\vec{n}$ est bien orthogonal à 2 vecteurs non colinéaires du plan (FDC). Donc $\vec{n}(0; -2; \sqrt{2})$ est un vecteur normal au plan (FDC).

Comme $\vec{n}$ est un vecteur normal aux plans (FDC) et (ABE), nous pouvons affirmer que ces deux plans sont parallèles.

2. c. Construction de la section du solide ADECBF par le plan (EMN):

Graphiquement, nous avons: